

# 呕吐及腹泻清理




## 转移病人

立即从企业中转移所有生病员工、顾客和其他人员



## 限制区域

使用警告胶带、警示锥、椅子或其他有效障碍物封锁区域，直到清洁和消毒完成



## 佩戴个人防护设备

使用一次性手套、口罩、发网、鞋套、一次性护罩、一次性围裙或一次性罩衣



## 将吸水材料应用于该区域

使用吸水粉末/固化剂、猫砂或纸巾



## 擦拭或铲起

放入塑料袋中密封



## 消毒

对所有受影响的食物接触表面和非食物接触表面使用漂白剂（氯）溶液或 158°F (70°C) 蒸汽消毒

- 比通常使用的漂白剂溶液更强劲的混合氯（漂白剂）溶液消毒（参见表 1：消毒剂浓度）
- 如果您的设施不允许使用漂白剂，请参见 EPA 允许用于该目的的消毒剂列表
- 对纺织品、地毯或家具以 158°F 蒸汽消毒五分钟，或 212°F 消毒一分钟



## 丢弃

扔掉所有废弃物品，包括手套、罩衣等，将垃圾从您的办公楼中转移出去



## 洗手

用肥皂和水用力擦洗双手至少二十 (20) 秒

表 1: 消毒剂浓度

| 漂白剂（次氯酸盐强度） | 水量   | 漂白剂量    | 浓度（PPM，百万分比浓度） |
|-------------|------|---------|----------------|
| 常规 5.25%    | 1 加仑 | 1 2/3 杯 | ~5000          |
| 6 – 6.25%   | 1 加仑 | 1 1/2 杯 | ~5000          |
| 浓度 8.25%    | 1 加仑 | 1 杯     | ~5000          |

